العبير
abeer
Abeer Medical Centers Company

29 JUL. 2026

Medical Report (Re-Visit) - تقرير طبي (زيارة متابعة)

Issue Date : 29-07-2026- 10:11 PM

هذا تقرير إلكتروني مُولد، لا حاجة لتوقيع، تم التحقق منه عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)
This is a generated electronic report, no signature is required, it has been verified via a QR code.

Subject : Doppler Scrotum
(Post-Varicocele Embolization)

الموضوع: أشعة دوبلر على الصفن
(بعد عملية انصمام دوالي الخصية)

Patient Name : Syed Muhammad Rizwan Shah
Passport No. : MN5140244
Re-Visit

اسم المريض : سيد محمد رضوان شاه
رقم جواز السفر : MN5140244
زيارة مرة أخرى

This letter serves to confirm that Mr. Syed Muhammad Rizwan Shah is currently under my medical care for his Varicocele Embolization Workup.

تؤكد هذه الرسالة أن سيد محمد رضوان شاه يخضع حاليًا لرعايتي الطبية لفحصه لإجراء انسداد دوالي الخصية.

CLINICAL STATUS : Varicocele Embolization
Examination performed using high frequency linear array transducer.

الحالة الإكلينيكية : قسطرة دوالي الخصية
تم إجراء الفحص باستخدام مجس خطي عالي التردد.

Left Testis is Lower Limit of normal in size without having any focal diffuse lesion in it.

الخصية اليسري في الحد الأدنى الطبيعي من حيث الحجم دون وجود أي آفة بؤرية أو منتشرة فيها.

LT Testis : Measures 39 x 31 x 32 mm
(Volume 14.1 ml).

اختبار الخصية LT: يبلغ القياس 39 × 31 × 32 ملم
(الحجم 14.1 مل) .

LT Epididymis : Measures 7.1 x 7.6 mm

الوبال الخصوي الأيسر: الأبعاد 7.1 × 7.6 مم

DOPPLER Flow Study :
Left Testicular RI is 0.52, SD Ratio 2.0

دراسة تدفق دوبلر :
مؤشر المقاومة الخصية اليسرى هو 0.52،
ونسبة الانحراف المعياري 2.0

Multiple Dilated Tubular Tortuous Venous Channels with Stasis of Blood giving serpentine appearance are noted in the in Left Scrotal SAC adjacent to the upper pole to testes, measuring about 3.1 - 3.3 mm. There is mild augmentation of flow on Color Doppler Analysis.

تم ملاحظة قنوات وريدية متعددة متوسعة وأنبوبية ومعقدة مع ركود الدم مما يعطي مظهرًا ثعبانيًا في كيس الصفن الأيسر بالقرب من الطرف العلوي للخصيتين، وتبلغ مقاساتها حوالي 3.1 - 3.3 ملم. هناك زيادة طفيفة في التدفق عند تحليل دوبلر الملون.

IMPRESSION :
* Left side varicocele (Grade-III)
* Bilateral intratesticular arterial resistive flow pattern is normal on color Doppler.
* Please Correlate Clinically.

الانطباع :
* دوالي الخصية الجهة اليسرى (الدرجة الثالثة)
* نمط تدفق الشرايين داخل الخصية ثنائي الجانب طبيعي على دوبلر اللون.
* يرجى المطابقة سريرياً.

Base on my medical assessment of patient, his condition is not on stage of travelling, Patient should take treatment atleast 3 months more, it's my advice to take medication and rest atleast 90 days more.

استنادًا إلى تقييمي الطبي للمريض، حالته ليست في مرحلة السفر، يجب على المريض أن يستمر في العلاج لمدة 3 أشهر على الأقل، ونصيحتي هي الاستمرار في تناول الأدوية والراحة لمدة 90 يومًا أخرى على الأقل.

Al-Abeer Medical Center
اللياقة الطبية
س.ت: ٢٠٥٥٠٠٦٦١٢
C.R. 2055006612
MEDICAL FITNESS
Tel.: 920015888